

Brytyjskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych wprowadziło zwyczaj posiadania przez osoby laryngektomowane, a chorujące równocześnie na choroby układu krążenia, kart identyfikacyjnych informujących w razie nagłego zasłabnięcia, o sposobie udzielania pierwszej pomocy.

W wypadku zaistnienia konieczności wykonania sztucznego oddychania akcją rozpoczyna się wówczas od odsłonięcia tracheostomy i po oczyszczeniu jej z wydzieliny podejmuje się oddychanie metodą usta-tracheostoma lub aparat Ambu-tracheostoma. Jeżeli ratownik zaznajomi się z kartą identyfikacyjną szanse na uratowanie laryngektomowanego są większe, niż osoby oddychającej torem fizjologicznym, gdyż tracheostoma umożliwia łatwiejszy dostęp do tchawicy.[1]

Przykładowa karta identyfikacyjna wydana przez PTL

W RAZIE WYPADKU!

Jestem po operacji usunięcia krtani.

Oddycham przez otwór
w TCHAWICY,

NIE przez NOS ani USTA.

W przypadku konieczności zastosowania sztucznego oddychania należy:

1. odsłonić i oczyścić otwór w szyi
2. nie skręcać głowy na boki, trzymać prosto z brodą do góry
3. sztuczne oddychanie stosować

metodą
USTA – OTWÓR W SZYI

4. uważać by woda nie dostała się do otworu w szyi

Grupa krwi

Imię i nazwisko

Adres

Telefon

W razie wypadku proszę powiadomić:

.....
.....
.....
.....
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych w Bielsku-Białej

[1] Anna Sinkiewicz: "Rak krtani. Poradnik dla pacjentów, logopedów i lekarzy"